

پیس گذاری



- دستگاه MRI موجب اختلال در کار دستگاه میشود. در صورت نیاز به MRI پزشک خود را در جریان قرار دهید.
- استفاده از تلفن همراه ، سشوار، چرخ خیاطی برقی و مسواک برقی باید با فاصله ۱۵ سانتیمتری باشد. هنگام استفاده از موبایل آن را در گوش سمت مخالف نسبت به محل قرارگیری دستگاه نگه دارید.
- هنگام مراجعه به فروردگاه کارت شناسایی مربوط به دستگاه را نشان دهید. قاب فلزی دستگاه موجب به صدا در آمدن زنگ خطر این سیستمها میشود.
- موقع ورود و خروج به فروشگاههایی که سیستم ایمنی دارند به آرامی از آنها عبور کنید و نزدیک و یا کنار آنها توقف نکنید.



WWW.PARS-HOSPITAL.COM




۰۱۳ - ۳۴۲۳۳

- از قرار گرفتن در معرض میدانهای الکتریکی با ولتاژ بالا و نواحی دارای میدانهای مغناطیسی یا اشعه به دلیل اختلال در کارکرد دستگاه خودداری کنید.
- امواج الکترومغناطیسی ایجاد شده توسط وسایل خانگی اغلب روی کارکرد دستگاه اثری ندارد در صورتی که هنگام استفاده از هرگونه وسیله برقی احساس تپش قلب یا سبکی سر یا گیجی کردید از وسیله مورد نظر دور شوید.
- انجام سی تی اسکن یا عکس برداری، ماموگرافی و سونوگرافی و استفاده از وسایل دندان پزشکی بی خطر هستند.
- انجام سنگ شکن، رادیوتراپی، الکتروکوتری و انجام هرگونه عمل جراحی باید با نظر و مشورت پزشک انجام شود.

نکات قابل توجه پس از ترخیص از بیمارستان:

- از باز کردن دست در سمتی که پیس میکر گذاشته شده تا چندین روز خودداری کنید.
- در آینده با دستی که پیس میکر گذاری در آن سمت شده از انجام کار سنگین و بلند کردن وسایل سنگین خودداری کنید. (برای جلوگیری از جابجایی ژنراتور و پایین آمدن آن داخل قفسه سینه و پارگی لید).
- از پوشیدن لباسهای تنگ یا هر عمل دیگری که موجب فشار مستقیم روی پیس میکر میشود مانند خوابیدن به همان سمت، فشار دادن یا دستکاری کردن ناحیه خودداری کنید.
- در منزل محل جراحی را کنترل کنید در صورت هرگونه علائم شامل درد، تورم، قرمزی یا ترشح فورا با پزشک تماس بگیرید.



- یک هفته بعد به پزشک مراجعه کنید جهت برداشتن بخیه ها و کنترل دستگاه
- درمورد فعالیتهایی مانند: راه رفتن، حمام کردن، بلند کردن اجسام سنگین، مسافرت رفتن، رانندگی همچنین مصرف دارو و غذا با اجازه پزشکتان عمل کنید.
- در صورت مشاهده، هر کدام از علائم زیر سریعاً با پزشک خود تماس بگیرید، تنگی نفس، سرگیجه، ضعف و یا خستگی مداوم، سکسه های طولانی، تپش قلب، ورم پاها، ساق ها، بازوها و مچ ها، احساس ناراحتی و درد شدید قفسه سینه



اقدامات قبل از انجام عمل پیس گذاری :

- ۱ - از صبح روز عمل ناشتا باشید.
- ۲ - فهرست تمام داروهای که مصرف میکنید در اختیار پزشک یا پرستار خود قرار دهید.
- ۳ - در صورت هرگونه حساسیت به دارو یا غذای خاصی به پزشک یا پرستار بخش اطلاع دهید.
- ۴ - موهای سینه خود را به طور کامل بتراشید.
- پس از انجام آمادگیهای لازم شما منتقل بخش آنژیوگرافی خواهید شد. پزشک پس از انجام بی حسی موضعی ایجاد برش کوچک در قسمت بالای قفسه سینه دستگاه پیس میکر را در زیر پوست قرار میدهد.
- ناحیه مورد نظر را با پانسمان استریل پوشانده و یک کیسه شن بر روی پانسمان برای جلوگیری از خون ریزی و تجمع خون در زیر پوست قرار داده میشود. سپس شما منتقل تخت خواهید شد.
- در صورت احساس درد و خونریزی از ناحیه پانسمان به پرستار اطلاع دهید. کیسه شن به مدت ۱۲ ساعت بر روی ناحیه پانسمان قرار داده میشود. تا ۲۴ ساعت حرکات دست محدود خواهد بود.
- زمان ترخیص از بیمارستان یک کارت شناسایی به شما داده خواهد شد. این کارت نشان میدهد که شما پیس میکر در بدن خود دارید بنابراین آن را همیشه همراه خود داشته باشید.

